

Feuille d'information aux patientes ayant bénéficié d'une IVG médicamenteuse sans échographie préalable

Appelez votre médecin/sage femme si vous avez l'un des éléments suivants:

- Vous vomissez dans les 15 premières minutes après avoir pris de la mifépristone.
- Vous avez une fièvre de 38° plus de 24 heures après avoir pris le misoprostol.
- Une semaine après avoir pris du misoprostol, vous présentez l'un des symptômes suivants:
 - *Vous n'avez pas eu de crampes et de saignements plus longs que vos règles*
 - *Votre saignement ne devient pas plus léger*
 - *Vous n'avez pas l'impression d'avoir expulsé la grossesse*
 - *Vous ne sentez pas que vos symptômes de grossesse (comme les nausées et la sensibilité des seins) disparaissent*
- À tout moment, vous présentez un des symptômes suivants:
 - *Une augmentation de la douleur / des crampes ou des saignements plus de 24 heures après la prise de misoprostol*
 - *Douleur ou crampes intenses qui ne s'améliorent pas avec des analgésiques, du repos ou une bouillotte*
 - *Assez de saignement pour imprégner 2 maxi serviettes par heure pendant plus de 2 heures*
 - *Expulser des caillots de sang plus gros qu'un citron pendant plus de 2 heures*
 - *Vertiges ou vomissements durant plus de 2 heures.*
 - *Faiblesse, nausée ou diarrhée durant plus de 24 heures*

Faites un dosage plasmatique d'HCG (prise de sang)

5 à 7 jours après la prise des médicaments

et communiquer le résultat à votre médecin/ sage femme